

殺虫殺菌剤

スタウトダントツ箱粒剤08

クロチアニジン・イソチアニル粒剤

平成27年12月9日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「ツマグロヨコバイ」の使用時期「は種時（覆土前）」を「は種時（覆土前）～移植当日」に変更する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「イネヒメハモグリバエ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネミズウムシ イネトモイシ ウカ類 ツマグロヨコバイ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和する。	4回以内 (移植時まで の処理は1回 以内、本田で の散布、空中 散布、無人機 散布は合計 3回以内)	3回以内 (移植時まで の処理は 1回以内、 本田では 2回以内)
	イネヒメグリバエ		は種時 (覆土前) ～移植当日 移植3日前 ～移植当日		育苗箱の上から 均一に散布する。		
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)		は種前		育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和する。		
	苗立枯細菌病 苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)		は種時 (覆土前)		育苗箱の上から 均一に散布する。		

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社